



Pansement alginate antibactérien au miel de Manuka - Medihoney - Boite de 5 ou de 10

Miel de Manuka (95%) et alginate de calcium. Action antibactérienne pour le soin des plaies de profondeur partielle ou totale avec exsudation modérée à abondante.

Pansement stérile non adhésif offrant un environnement favorable à la cicatrisation.

Barrière antibactérienne empêchant la prolifération des bactéries y compris celles à souches résistantes (SARM, ERV, Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter). Empêche la formation de biofilms.

Aide à réduire l'oedème, la douleur, et la quantité d'exsudat.

Favorise la formation de liquide (action osmotique) qui aide à nettoyer la plaie et permet d'éliminer les débris, bactéries, cellules endogènes, dépôts et tissus nécrotiques. Les mauvaises odeurs sont rapidement éliminées.

L'utilisation des pansements Alginate au miel Medihoney peut réduire de façon considérable le pH de la surface de la plaie. La formation d'un milieu acide est favorable à la cicatrisation de la plaie.

Apporte un milieu humide favorisant les processus de granulation et d'épithélialisation, réduisant le traumatisme et la douleur au moment de changer le pansement.

Améliore le taux de cicatrisation jusqu'à 30% par rapport à un pansement standard. Procure un débridement plus rapide que certains pansements d'hydrogel.

Indiquer pour le traitement de:

- Ulcères du pied diabétique et des jambes/pieds.
- Plaies de pression.
- Plaies infectées.
- Greffes et zones donneuses.
- Plaies traumatiques et chirurgicales.
- Plaies nécrosées et sphacélées.
- Plaies oncologiques et malodorantes.
- Plaies superficielles et profondes.
- Brûlures 1er ou 2eme degré.
- 1er soins en général.
- Diverses affections dermatologiques.

Composé de:

Miel de Manuka antibactérien (95%) de Nouvelle-Zélande ou Leptospermum Scoparium.

- Espèce de miel la plus étudiée pour le traitement des plaies et des brûlures.
- Taux de Methylglyoxal (MGO): > 312 mg/kg (niveau très élevé d'activité antibactérienne).
- pH compris entre 3,5 et 4,5.

Alginate de calcium (5%).

- Non adhésif.
- Sans latex.
- Pose de 1 à 7 jours.
- A changer lorsqu'il a été dissous par l'exsudat de la plaie.
- Découpable.
- Doit être recouvert d'un pansement stérile secondaire absorbant.

Alternative: Remplir la plaie avec [le miel médical antibactérien cicatrisant MEDIHONEY](#) ou avec [le Gel antibactérien au miel pour plaies MEDIHONEY](#) et ensuite recouvrir avec un pansement gel antibactérien au miel MEDIHONEY.

Stérilisation Rayon Gamma.

Dimensions disponibles:

- Pansement 5 x 5 cm, vendu par boîte de 10.
- Pansement 10 x 10 cm, vendu par boîte de 5.
- Mèche 1,9 x 30 cm, , vendu par boîte de 5.

Vendu sous pochette individuelle stérile.

Boîte protectrice de 5 à 10 pansements ou mèches.

Matériel médical CE .